



La Fougèraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

GSM 0477/65 83 17 - Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

E-mail: info@fougères.be - www.fougères.be - www.varens.be

☀ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre. P = persistant ; SP = semi-persistant. F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol. ▲ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire. I = Indigène.							
	Expo	Feuil.	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
<i>Adiantum pedatum</i>	◐●	SP	50	40	H		Feuillage très fin aux pinnules en forme d'éventail. Fougère à rhizome court formant des touffes larges.
<i>Adiantum pedatum</i> 'japonicum'	◐●	SP	40	30	H		Sur de hauts pétioles grêles, les pinnules sont disposées en éventail teinté de rose et verdissant ensuite. Touffes à rhizomes courts.
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Frizeliae'	☀●●		30	30	T		Les pinnules disposées en spirale sur le pétiole font penser à un escalier en colimaçon. Bouquets arqués.
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Minutissimum'	☀●●		30	30	T		Plus petite que l'espèce, forme des touffes denses.
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Victoriae'	☀●●		50	40	T		Fougère à la silhouette évasée. Présente un aspect particulier avec ses pinnules croisées en V.
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Vernoniae'	☀●●		40	30	T		Fougère aux frondes d'un vert pâle translucide, très finement découpées en dessins géométriques triangulaires.
<i>Athyrium niponicum</i> 'Pictum'	◐●		40	40	H		Fougère portant des frondes à reflets bleu et gris métallique toute la saison. Rhizome brun-rouge traçant un peu. Le sol doit être bien drainé.
<i>Athyrium niponicum</i> 'Silver Falls'	◐●		40	40	H		Plus effilé et plus argenté que <i>A. niponicum</i> 'Pictum'.
<i>Cyrtidium fortunei</i>	◐●	P	50	40	H		Appelée fougère houx, elle présente une silhouette dressée. Les frondes, vert foncé mat, divisées une fois en pinnules allongées et étroites. Situation abritée et drainée. Rusticité -15 C°.
<i>Cyrtidium fortunei</i> 'Clivicola'	◐●	P	40	50	H		Comme l'espèce, port étalé ou tombant. Pour situations abritées, drainées ou en pot. Rusticité -15 C°.
<i>Cystopteris bulbifera</i>	◐●		40-50		F		Frondes vert tendre longuement effilées, traversées par un pétiole rouge. Sur l'envers de la fronde, plusieurs bulbilles, qui en arrivant sur le sol, donnent naissance à d'autres plantes. Propagation rapide.
<i>Dryopteris affinis</i> 'Crispa'	◐●	SP	40-50	40	T		Frondes crispées et gaufrées, couvertes d'écailles dorées sur le pétiole. Touffe dressée, dense et vigoureuse.
<i>Dryopteris clintoniana</i>	◐●	SP	50-70	50	F à M		Frondes aux découpes arrondies, aux pinnules larges, d'un vert pâle mat. Souche étalée et drageonnante.
<i>Dryopteris dilatata</i> 'Crispa White Side'	◐●		40	20	T		Mêmes caractéristiques que l'espèce mais présente un feuillage fortement frisé.
<i>Dryopteris erythrosora</i> 'Prolifica'	◐●	P	40	50	T		Plus basse que l'espèce. Souche à étalement court. Les frondes légèrement gaufrées aux pinnules rétrécies. Bien teintées de rose rougeâtre dans leur jeunesse.
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Crispa'	☀●		40-50	50	T		Fougère aux frondes gaufrées. Plus basse que l'espèce. Robuste, forme avec l'âge des touffes dense et imposantes.
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Cristata'	☀●		50	50	T		Fonde bifurquée à l'extrémité des pinnules. Forte souche.
<i>Dryopteris marginalis</i>	◐●		40-50	30	H à M		Rhizome court, fronde bleutée, bipennée en un cône évasé, laissant toujours apparaître au centre son nid de crosses.
<i>Dryopteris sieboldii</i>	◐	P	40	60	T	☹	Les frondes à découpe particulière s'allongeant de deux pinnules chaque année. Silhouette lâche, étalée. Pour situation abritée. Rusticité : -15 C°.
<i>Osmunda cinnamomea</i> 'Foekyensis'	◐		50	30	F à M		Semblable à l'espèce mais plus petite et pétiole rouge.
<i>Phegopteris connectilis</i> Indigène	◐●		20-40	50	F		Sur un rhizome traçant, pétiole grêle portant une fronde triangulaire velue sur les deux faces. Les pennes basales, déjetées vers le bas, représentent une queue d'hirondelle. Apprécie les sols acide et la fraîcheur.
<i>Phyllitis scolopendrium</i> Indigène	◐●	P	40-60	30	F	▲	Frondes entières, rubanées, ressemblant à une longue langue et disposées en rosette ou pendante si la plante est accrochée dans les fissures de rochers.



La Fougèraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 E-mail: info@fougères.be - www.fougères.be - www.varens.be

☀ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre. P = persistant ; SP = semi-persistant. F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol. ▲ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire. I = Indigène.							
	Expo	Feuil.	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
Phyllitis scolopendrium 'Angustifolia'	◐●	P	30-60	30	F	▲	Comme l'espèce, frondes plus étroites et à bords finement crispés..
Phyllitis scolopendrium 'Cristata'	◐●	P	20-40	30	F	▲	Comme l'espèce, aux frondes plus courtes, ondulées et divisées sur les extrémités.
Phyllitis scolopendrium 'Furcatum'	◐●	P	30	20	F	▲	Comme l'espèce, frondes aux extrémités corybiformes.
Phyllitis scolopendrium 'Undulata'	◐●	P	50	30	F	▲	Comme l'espèce, frondes au limbe ondulé.
Polypodium vulgare Indigène	☀●	P	30-40	20	T		Plantes sculpturales pour vieux murs, talus, escaliers, se contente de peu de terre. Rhizomes charnus. Frondes coriaces, profondément lobées, vert foncé. Au soleil, veillez à l'arrosage jusqu'à son installation.
Polypodium vulgare 'Bifido multifido'	☀●	P	30-40	20	T		Comme l'espèce, variété aux extrémités épatées et multibifurquées.
Polypodium vulgare 'Cornubiense'	☀●	P	30	20	T		Comme l'espèce, frondes fortement divisées, aux pennes se chevauchant, donnant un aspect dense.
Polypodium interjectum Indigène	◐●	P	20-40	20	T		Fougère traçante formant avec le temps de grandes colonies sur des vieux murs, talus ombragés, au bord d'escaliers ou très belle en pot.
Polystichum acrostichoïdes	◐●	P	50	30	T		Fougère en rosette étalée, aux frondes coriaces d'un vert foncé et aux découpes rondes. Les frondes fertiles, plus dressées s'effilant brusquement sur les sommets. Accepte les situations ombreuses mais demande un sol drainé.
Polystichum aculeatum Indigène	◐●	P	50	80	T		Frondes persistantes vert sombre. Silhouette en rosette très ouverte, étalée, restant parfaite jusqu'au printemps.
Polystichum braunii	◐	SP	50	40	T F		Fougère déployant des crosses particulièrement blanches, d'aspect floconneux, laissant un léger duvet sur les frondes. Sur sols frais plutôt acide.
Polystichum rigens	◐●	P	30	40	T		Fougère particulière par ses frondes brillantes, coriaces et piquantes. Formant une silhouette très ouverte ; sur sol plutôt acide. Rusticité -15 C°.
Polystichum setiferum 'Divisilobum'	◐●	P	50	50	T		Comme l'espèce, mais plus petite, fine découpe, présence de bourgeons adventices sur le pétiole, donnant naissance à des plantules.
Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	◐●	P	40	80	T		Comme l'espèce, mais frondes irrégulières parfois très longue, très finement découpées. Les écailles rousses du pétiole marquent la fronde jusqu'à sa pointe. Silhouette étalée. Reste belle durant tout l'hiver.
Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'	◐●	P	50	50	T		Comme l'espèce, mais plus petite, forme de larges coussins moussus avec ses frondes à pinnules finement divisées, très denses et se chevauchant.
Polystichum setiferum 'Proliferum'	◐●	P	50	50	T		Comme l'espèce, silhouette étalée, frondes plus finement découpées, formation de bourgeons adventices le long du pétiole des plantes adultes.
Polystichum tsus-sinense	◐	P	30	30	T		Silhouette érigée. Les frondes vert sombre, longuement effilées et coriaces, sont marquées par un pétiole noir jusqu'à la pointe.. Seulement pour une situation abritée. Rusticité -15 C°.
Thelypteris decursive-pinnata	◐●		40	50	F		Ensemble de frondes hautes et courtes d'un vert mat très lumineux dont les pennes sont connectées par une aile le long du rachis. Rhizome légèrement rampant produisant plusieurs pieds, silhouette dressée, formant des colonies larges. Fougère hâtive.



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 E-mail: info@fougeres.be - www.fougères.be - www.varens.be

☀ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre.

P = persistant ; SP = semi-persistant.

F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol.

▲ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire.

I = Indigène.

	Expo	Feuil.	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
<i>Thelypteris palustris</i> Indigène	☀ ◐		30-80	100	M		Plante à rhizome traçant, émettant des frondes solitaires et espacées, très sociable (traverse les autres végétaux sans faire concurrence). Longue fronde étroite, effilée vert tendre. Pénètre la partie inondée jusqu'à 30 cm. Sur sol plutôt calcaire.
<i>Woodsia obtusa</i>	◐ ●		30	10	T		Fronde lumineuse vert clair mat avec un pétiole jaune ; formant de grands buissons aérés pouvant se propager largement. Apprécie des sols toujours bien drainés.