



La Fougèraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

GSM 0477/65 83 17 - Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

E-mail: info@fougères.be - www.fougères.be - www.varens.be

☀ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre. P = persistant ; SP = semi-persistant. F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol. ▲ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire. I = Indigène.							
	Expo	Feuil.	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
<i>Adiantum pedatum</i> 'Imbricatum'	◐●	SP	20	30	H		Fougère qui forme avec l'âge de larges coussins ; lente mais très robuste. Teinte jaunissante à l'automne. Petites frondes aux pinnules se chevauchant comme des tuiles.
<i>Adiantum venustum</i>	◐●	SP	25	40	H		Frondes légères à pinnules pendantes en petit éventail denté. Rhizome traçant formant de larges touffes. Aspect délicat et pourtant très résistante.
<i>Asplenium ceterach</i> Indigène	☀◐	P	10	10	T	▲	Fougère de situation chaude, se plait en murets ou sur rocher. Les pinnules s'enroulent en cas de soleil, la face écailleuse et argentée ainsi exposée forme une protection. Reviviscente.
<i>Asplenium trichomanes</i> Indigène	☀●	P	15	20	T	▲	Croissance dynamique, conquiert les moindres fissures de rochers. Une fois installée, elle se plaque sur le muret comme une araignée.
<i>Asplenium trichomanes</i> 'Incisum'	☀●	P	15	20	T	▲	Comme l'espèce, mais les pinnules sont finement incisées.
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Frizeliae'	☀◐●		30	30	T		Les pinnules disposées en spirale sur le pétiole font penser à un escalier en colimaçon. Bouquets arqués.
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Minutissimum'	☀◐●		30	30	T		Plus petite que l'espèce, forme des touffes denses.
<i>Blechnum penna-marina</i>	☀●	P	20	50	F à M	☹	Epais rhizomes traçants denses. Frondes coriaces et brillantes, dressées, d'abord vert rougeâtre, ensuite vert foncé.
<i>Blechnum penne-marina</i> 'Alpina'	☀●	P	10-15	30	F	☹	Fougères rampantes formant des colonies basses. Les frondes fertiles émergent dressées à la verticale d'un éclat violacé.
<i>Blechnum spicant</i> Indigène	◐●	P	20-60	50	F à M	☹	Fougère à dimorphisme foliaire : frondes fertiles érigées en arête de poisson, un peu violacées. De nombreuses frondes stériles, coriaces et épaisses sont disposées en rosette étalée et persistante.
<i>Cheilanthes lanosa</i>	☀◐	SP	20-30	30	S		Petite fougère aux frondes recouverte d'un duvet laineux lui donnant un aspect argenté. Touffe dense sur un sol bien drainé. Reviviscente ; A protéger de l'humidité et du gel en hiver.
<i>Cystopteris dickiana</i>	◐●		10-15	10	T		Se développe tôt au printemps, fougère de rocher, petite mais vigoureuse. Frondes étroites et un peu écailleuses.
<i>Cystopteris fragilis</i> Indigène	◐●		10-15	15	T		Souche à rhizome court, robuste et dynamique. Frondes très effilées de texture fine. Fougère de rocher ou talus dans la mousse.
<i>Dryopteris affinis</i> 'Crispa congesta'	◐●	SP	20	30	T		Petite fougère touffue, aux frondes torturées, crispées.
<i>Dryopteris dilatata</i> 'Lepidota Crispa Cristata'	◐●		20	20	T		Les frondes sont très finement découpées et frisées à l'extérieur.
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> Indigène	◐●		20	60	H		Les frondes issues du long rhizome rampant sont triangulaires sur un pétiole grêle. Le limbe s'inclinant en angle droit par rapport à la lumière. Plutôt sur sol acide frais.
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> 'Plumosum'	◐●		20	60	H		Semblable à l'espèce. Frondes aux pinnules plus larges qui se chevauchent. Vert acidulé à l'état jeune, ensuite plus sombre.
<i>Gymnocarpium robertianum</i> Indigène	◐●		20	60	H		Rhizome longuement rampant d'où émergent de fines frondes à pennes inclinées largement triangulaires, vert clair, apprécie le calcaire et un sol bien drainé, en situation découverte ou ombreuse.
<i>Phegopteris connectilis</i> Indigène	◐●		20-40	50	F		Sur un rhizome traçant, pétiole grêle portant une fronde triangulaire velue sur les deux faces. Les pennes basales, déjetées vers le bas, représentent une queue d'hirondelle. Apprécie les sols acide et la fraîcheur.
<i>Phyllitis scolopendrium</i> 'Cristata'	◐●	P	20-40	30	F	▲	Comme l'espèce, aux frondes plus courtes, ondulées et divisées sur les extrémités.
<i>Phyllitis scolopendrium</i> 'Furcatum'	◐●	P	30	20	F	▲	Comme l'espèce, frondes aux extrémités corybiformes.



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

E-mail: info@fougères.be - www.fougères.be - www.varens.be

☀ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre.

P = persistant ; SP = semi-persistant.

F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol.

▲ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire.

I = Indigène.

	Expo	Feuil.	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
<i>Polypodium vulgare</i> 'Cornubiense'	☀ ●	P	30	20	T		Comme l'espèce, frondes fortement divisées, aux pennes se chevauchant, donnant un aspect dense.
<i>Polypodium interjectum</i> Indigène	◐ ●	P	20-40	20	T		Fougère traçante formant avec le temps de grandes colonies sur des vieux murs, talus ombragés, au bord d'escaliers ou très belle en pot.
<i>Polystichum rigens</i>	◐ ●	P	30	40	T		Fougère particulière par ses frondes brillantes, coriaces et piquantes. Formant une silhouette très ouverte ; sur sol plutôt acide. Rusticité -15 C°.
<i>Polystichum setiferum</i> 'Congestum'	◐ ●	P	20	20	T		Comme l'espèce, mais frondes denses et plus ramassées, aux pinnules se chevauchant. Crosses aux écailles blanches.
<i>Polystichum tsus-sinense</i>	◐	P	30	30	T		Silhouette érigée. Les frondes vert sombre, longuement effilées et coriaces, sont marquées par un pétiole noir jusqu'à la pointe.. Seulement pour une situation abritée. Rusticité -15 C°.
<i>Woodsia ilvensis</i>	◐ ●		15	10	T		Fougère en touffe dense gazonnante. Frondes vert terne, lancéolée, couvertes de poils fins.
<i>Woodsia obtusa</i>	◐ ●		30	10	T		Fronde lumineuse vert clair mat avec un pétiole jaune ; formant de grands buissons aérés pouvant se propager largement. Apprécie des sols toujours bien drainés.