



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

GSM 0477/65 83 17 - Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

E-mail: info@fougères.be - www.fougères.be - www.varens.be

☀ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre. P = persistant ; SP = semi-persistant. F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol. ▲ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire. I = Indigène.							
	Expo	Feuil.	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
<i>Adiantum pedatum</i>	◐●	SP	50	40	H		Feuillage très fin aux pinnules en forme d'éventail. Fougère à rhizome court formant des touffes larges.
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Cristatum'	☀◐●		60-80	30	T		Plus petite que l'espèce, les extrémités se terminent en divisions corymbiformes.
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Plumosum'	☀◐●		60	40	T		Découpes extrêmement fines, plumeuses, jaunissantes à l'automne.
<i>Athyrium filix-femina</i> 'Victoriae'	☀◐●		50	40	T		Fougère à la silhouette évasée. Présente un aspect particulier avec ses pinnules croisées en V.
<i>Athyrium otophorum</i> 'Okunum'	◐●	SP	60	60	T		Fougère vert pâle tirant vers le crème, traversée et portée par un pétiole brillant bien teinté de rouge. Frondes triangulaires larges.
<i>Athyrium vidalii</i>	◐●		80	50	F		Épais rhizomes aux crosses rouge-violacé, développant des frondes vert mat légèrement pigmentées de rouge portées sur de très longs pétioles.
<i>Cyrtonium falcatum</i>	◐	SP	60	40	H		Fougère au port érigé. Les frondes sont coriaces et très luisantes, une fois divisée en large pinnules effilées. Convient pour les emplacements pierreux, drainés et abrités. Rusticité : -15 C°.
<i>Cyrtonium fortunei</i>	◐●	P	50	40	H		Appelée fougère houx, elle présente une silhouette dressée. Les frondes, vert foncé mat, divisées une fois en pinnules allongées et étroites. Situation abritée et drainée. Rusticité -15 C°.
<i>Dryopteris affinis</i> Indigène	◐●	SP	80-120	60	T		Fougère, robuste et abondante, formant avec l'âge de larges souches. Superbe au déploiement par ses crosses aux fortes écailles cuivrées. Grande fronde luisante divisée une fois.
<i>Dryopteris affinis</i> 'Crispa'	◐●	SP	40-50	40	T		Frondes crispées et gaufrées, couvertes d'écailles dorée sur le pétiole. Touffe dressée, dense et vigoureuse.
<i>Dryopteris affinis</i> 'Cristata'	◐●	SP	60	60	T		Fougère aux frondes brillantes éclairées sur ses extrémités par des divisions courtes plus claires. Souche vigoureuse. Touffe plus basse que l'espèce.
<i>Dryopteris affinis</i> 'Cristata the king'	◐●	SP	80	60	T		Larges touffes denses, frondes puissantes dont la pointe des pinnules est bifurquée comme des couronnes.
<i>Dryopteris affinis</i> 'Pinderii'	◐●	P	80-120	50	T		Fougère ayant une silhouette érigée, dressée, aux frondes étroites et gaufrées. En certains lieux, on peut l'utiliser comme plante de structure. Puissante, sans exigence.
<i>Dryopteris bushiana</i>	◐●	P	60	60	T		Fronde brillante vert soutenu, divisée une fois. Forme des bouquets ouverts, persistants. Accepte la sécheresse.
<i>Dryopteris carthusiana</i> Indigène	◐	SP	60-80	50	T à M		Long pétiole portant des frondes largement triangulaires, vert clair presque acidulé, deux à trois fois divisé. Les pinnules sont dentées. Couronne peu fournie sur un épais rhizome rampant au-dessus du sol. Apprécie l'acidité.
<i>Dryopteris clintoniana</i>	◐●	SP	50-70	50	F à M		Frondes aux découpes arrondies, aux pinnules larges, d'un vert pâle mat. Souche étalée et drageonnante.
<i>Dryopteris cristata</i> Indigène	◐		60	40	F à M		Touffe peu fournie à dimorphisme foliaire. Les frondes stériles courtes, en rosette étalée, sont suivies de longues frondes fertiles étroites et dressées. Apprécie l'acidité.
<i>Dryopteris cycadina</i>	◐●	P	70-80	50	T		Fougère à la silhouette aérée. Frondes larges. Déploiement des crosses couvertes d'écailles noires et laissant une pointe tombante. Sol plutôt acide.
<i>Dryopteris dilatata</i> Indigène	◐●	SP	80-120	50	T		Fougère à couronne évasée de frondes luisantes vert sombre parsemées de glandes jaunâtres. La couleur des jeunes pousses contraste avec les frondes âgées. Apprécie les lieux frais
<i>Dryopteris erythrosora</i>	◐●	P	60	40	T		Souche dressée et aérée. Portées sur un long pétiole, les frondes brillantes, largement triangulaires sont d'abord rose rougeâtre, vert ensuite. Développement coloré toute la saison.
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Crispa'	☀●		40-50	50	T		Fougère aux frondes gaufrées. Plus basse que l'espèce. Robuste, forme avec l'âge des touffes dense et imposantes.



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

E-mail: info@fougères.be - www.fougères.be - www.varens.be

☀ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre. P = persistant ; SP = semi-persistant. F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol. ▲ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire. I = Indigène.							
	Expo	Feuil.	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Cristata'	☀ ●		50	50	T		Fonde bifurquée à l'extrémité des pinnules. Forte souche.
<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Linearis Polydactylon'	☀ ●		80-100	60	T		Frondes finement divisées en pinnules linéaires et fourchues.
<i>Dryopteris marginalis</i>	◐ ●		40-50	30	H à M		Rhizome court, fronde bleutée, bipennée en un cône évasé, laissant toujours apparaître au centre son nid de crosses.
<i>Matteuccia orientalis</i>	◐ ●		60	150	H		Les frondes stériles, une fois divisées, à pinnules larges, sont disposées en cônes très évasés formant des touffes à aspect exotique. Les frondes fertiles, à port incliné, coriaces et brillantes, renferment les amas de spores.
<i>Onoclea sensibilis</i>	◐		60	100-150	F à M		Rhizome traçant émettant des frondes solitaires en colonies denses. Frondes stériles à pennes lobées sur un long pétiole, frondes fertiles plus courtes. Peut pénétrer les premiers centimètres d'eau, en sol plutôt acide. Couleur d'automne orangée.
<i>Osmunda cinnamomea</i> 'Foekyensis'	◐		50	30	F à M		Semblable à l'espèce mais plus petite et pétiole rouge.
<i>Osmunda claytoniana</i>	◐		80	100	F à M		Touffes de frondes stériles à segments lobés réunis en plusieurs bouquets sur une souche rhizomateuse. Les frondes fertiles, plus longues, sont interrompues en leur milieu par une production de spores d'abord noirâtres en suite jaune rouille.
<i>Phyllitis scolopendrium</i> Indigène	◐ ●	P	40-60	30	F	▲	Frondes entières, rubanées, ressemblant à une longue langue et disposées en rosette ou pendante si la plante est accrochée dans les fissures de rochers.
<i>Phyllitis scolopendrium</i> 'Angustifolia'	◐ ●	P	30-60	30	F	▲	Comme l'espèce, frondes plus étroites et à bords finement crispés..
<i>Phyllitis scolopendrium</i> 'Undulata'	◐ ●	P	50	30	F	▲	Comme l'espèce, frondes au limbe ondulé.
<i>Polystichum acrostichoïdes</i>	◐ ●	P	50	30	T		Fougère en rosette étalée, aux frondes coriaces d'une vert foncé et aux découpes rondes. les frondes fertiles, plus dressées s'effilant brusquement sur les sommets. Accepte les situations ombreuses mais demande un sol drainé.
<i>Polystichum aculeatum</i> Indigène	◐ ●	P	50	80	T		Frondes persistantes vert sombre. Silhouette en rosette très ouverte, étalée, restant parfaite jusqu'au printemps.
<i>Polystichum andersonii</i>	◐ ●	SP	60	40	T		Cône érigé de frondes larges. Les crosses sont très blanches et laineuses. Produit à l'extrémité des frondes 1 bulbille.
<i>Polystichum braunii</i>	◐	SP	50	40	T F		Fougère déployant des crosses particulièrement blanches, d'aspect floconneux, laissant un léger duvet sur les frondes. Sur sols frais plutôt acide.
<i>Polystichum munitum</i>	◐ ●	P	60	80	T		Touffe vigoureuse à rhizome court pouvant devenir large. Frondes une fois découpées à lobes étroit et acuminé, vert foncé, parcheminée et coriace. Apprécie des sols frais à sec toujours bien drainés.
<i>Polystichum polyblepharum</i>	◐ ●	P	60	80	T		Fougère aux frondes persistante d'une vert lustré, couverte de poils doré surtout au déploiement. Les frondes poussent en couronne très arquées vers l'extérieur.
<i>Polystichum setiferum</i> Indigène	◐ ●	P	80	60	T		Frondes lancéolées, vert foncé, portant des dents soyeuses. Silhouette érigée, parfois plus ouverte, les crosses se déploient en exposant de nombreuses écailles argentées. Facile et vigoureuse.



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

E-mail: info@fougères.be - www.fougères.be - www.varens.be

☀ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre.

P = persistant ; SP = semi-persistant.

F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol.

▲ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire.

I = Indigène.

	Expo	Feuil.	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
Polystichum setiferum 'Bevis'	◐●	P	80	100	T		Comme l'espèce mais les frondes, lisses, montrent des pinnules plus allongées et espacées, les segments s'incurvent gracieusement vers l'extrémité. Touffe de taille imposante. Variété stérile, les frondes sont utilisées en bouquetterie.
Polystichum setiferum 'Dalhem'	◐●	P	60-70	60	T		Comme l'espèce, mais plus ouverte et gracieuse, dense et vigoureuse, frondaison cotonneuse. Contraste des jeunes frondes vert tendre sur les frondes plus âgées.
Polystichum setiferum 'Divisilobum'	◐●	P	50	50	T		Comme l'espèce, mais plus petite, fine découpe, présence de bourgeons adventices sur le pétiole, donnant naissance à des plantules.
Polystichum setiferum 'Plumosum'	◐●	P	80	60	T		Comme l'espèce, mais silhouette érigée parfois plus ouverte, les frondes sont finement découpées et plumeuses, légères.
Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'	◐●	P	50	50	T		Comme l'espèce, mais plus petite, forme de larges coussins moussus avec ses frondes à pinnules finement divisées, très denses et se chevauchant.
Polystichum setiferum 'Proliferum'	◐●	P	50	50	T		Comme l'espèce, silhouette étalée, frondes plus finement découpées, formation de bourgeons adventices le long du pétiole des plantes adultes.
Polystichum setiferum 'Wollastonii'	◐	P	60-70	50	T		Comme l'espèce, mais silhouette plus ramassée, frondes plus fines.
Thelypteris palustris Indigène	☀◐		30-80	100	M		Plante à rhizome traçant, émettant des frondes solitaires et espacées, très sociable (traverse les autres végétaux sans faire concurrence). Longue fronde étroite, effilée vert tendre. Pénètre la partie inondée jusqu'à 30 cm. Sur sol plutôt calcaire.