



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

GSM 0477/65 83 17 - Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

E-mail: info@fougères.be - www.fougères.be - www.varens.be

La Fougeraie							
☼ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre. P = persistant ; SP = semi-persistant. F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol. ▲ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire. I = Indigène.							
	Expo	Feuil.	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
<i>Adiantum pedatum</i>	◐●	SP	50	40	H		Feuillage très fin aux pinnules en forme d'éventail. Fougère à rhizome court formant des touffes larges.
<i>Adiantum pedatum</i> 'japonicum'	◐●	SP	40	30	H		Sur de hauts pétioles grêles, les pinnules sont disposées en éventail teinté de rose et verdissant ensuite. Touffes à rhizomes courts.
<i>Adiantum pedatum</i> 'Imbricatum'	◐●	SP	20	30	H		Fougère qui forme avec l'âge de larges coussins ; lente mais très robuste. Teinte jaunissante à l'automne. Petites frondes aux pinnules se chevauchant comme des tuiles.
<i>Adiantum venustum</i>	◐●	SP	25	40	H		Frondes légères à pinnules pendantes en petit éventail denté. Rhizome traçant formant de larges touffes. Aspect délicat et pourtant très résistante.
<i>Athyrium niponicum</i> 'Pictum'	◐●		40	40	H		Fougère portant des frondes à reflets bleu et gris métallique toute la saison. Rhizome brun-rouge traçant un peu. Le sol doit être bien drainé.
<i>Athyrium niponicum</i> 'Silver Falls'	◐●		40	40	H		Plus effilé et plus argenté que <i>A. niponicum</i> 'Pictum'.
<i>Cyrtonium falcatum</i>	◐	SP	60	40	H		Fougère au port érigé. Les frondes sont coriaces et très luisantes. Une fois divisée en large pinnules effilées. Convient pour les emplacements pierreux, drainés et abrités. Rusticité : -15 C°.
<i>Cyrtonium fortunei</i>	◐●	P	50	40	H		Appelée fougère houx, elle présente une silhouette dressée. Les frondes, vert foncé mat, divisées une fois en pinnules allongées et étroites. Situation abritée et drainée. Rusticité -15 C°.
<i>Cyrtonium fortunei</i> 'Clivicola'	◐●	P	40	50	H		Comme l'espèce, port étalé ou tombant. Pour situations abritées, drainées ou en pot. Rusticité -15 C°.
<i>Dryopteris marginalis</i>	◐●		40-50	30	H à M		Rhizome court, fronde bleutée, bipennée en un cône évasé, laissant toujours apparaître au centre son nid de crosses.
<i>Dryopteris stewartii</i>	◐		80	70	H		Large frondes triangulaires, très effilées sur les pointes, couleur fraîche et claire, silhouette étalée. Convient en sol plutôt acide.
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> Indigène	◐●		20	60	H		Les frondes issues du long rhizome rampant sont triangulaires sur un pétiole grêle. Le limbe s'inclinant en angle droit par rapport à la lumière. Plutôt sur sol acide frais.
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> 'Plumosum'	◐●		20	60	H		Semblable à l'espèce. Frondes aux pinnules plus larges qui se chevauchent. Vert acidulé à l'état jeune, ensuite plus sombre.
<i>Gymnocarpium robertianum</i> Indigène	◐●		20	60	H		Rhizome longuement rampant d'où émergent de fines frondes à pennes inclinées largement triangulaires, vert clair, apprécie le calcaire et un sol bien drainé, en situation découverte ou ombreuse.
<i>Matteuccia orientalis</i>	◐●		60	150	H		Les frondes stériles, une fois divisées, à pinnules larges, sont disposées en cônes très évasés formant des touffes à aspect exotique. Les frondes fertiles, à port incliné, coriaces et brillantes, renferment les amas de spores.