



La Fougèraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique

GSM 0477/65 83 17 - Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24

E-mail: info@fougères.be - www.fougères.be - www.varens.be

☀ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre.

P = persistant ; SP = semi-persistant.

F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol.

▲ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire.

I = Indigène.

	Expo	Feuil	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
Athyrium filix-femina Indigène	☀●		100-120	60	T		Fougère d'un vert tendre, très fine découpe. Frondes nombreuses et vigoureuses. Bouquets dressés au soleil, plus étalés à l'ombre. Se colore à l'automne de tons jaunissants.
Athyrium filix-femina 'Cristatum'	☀●		60-80	30	T		Plus petite que l'espèce, les extrémités se terminent en divisions corymbiformes.
Athyrium filix-femina 'Rotstiel' indigène	☀●		100-120	60			Comme l'espèce, les pétioles rouge translucide marquent les frondes jusqu'à leur sommet.
Athyrium vidalii	◐●		80	50	F		Épais rhizomes aux crosses rouge-violacé, développant des frondes vert mat légèrement pigmentées de rouge portées sur de très longs pétioles.
Dryopteris affinis Indigène	◐●	SP	80-120	60	T		Fougère, robuste et abondante, formant avec l'âge de larges souches. Superbe au déploiement par ses crosses aux fortes écailles cuivrées. Grande fronde luisante divisée une fois.
Dryopteris affinis 'Cristata the king'	◐●	SP	80	60	T		Larges touffes denses, frondes puissantes dont la pointe des pinnules est bifurquée comme des couronnes.
Dryopteris affinis 'Pinderii'	◐●	P	80-120	50	T		Fougère ayant une silhouette érigée, dressée, aux frondes étroites et gaufrées. En certains lieux, on peut l'utiliser comme plante de structure. Puissante, sans exigence.
Dryopteris carthusiana Indigène	◐	SP	60-80	50	T à M		Long pétiole portant des frondes largement triangulaires, vert clair presque acidulé, deux à trois fois divisé. Les pinnules sont dentées. Couronne peu fournie sur un épais rhizome rampant au-dessus du sol. Apprécie l'acidité.
Dryopteris cycadina	◐●	P	70-80	50	T		Fougère à la silhouette aérée. Frondes larges. Déploiement des crosses couvertes d'écailles noires et laissant une pointe tombante. Sol plutôt acide.
Dryopteris dilatata Indigène	◐●	SP	80-120	50	T		Fougère à couronne évasée de frondes luisantes vert sombre parsemées de glandes jaunâtres. La couleur des jeunes pousses contraste avec les frondes âgées. Apprécie les lieux frais
Dryopteris filix-mas Indigène	☀●		100-120	60	T		Fougère se plaisant en toute situation même sèche au soleil. La fougère la plus robuste forme avec l'âge de larges souches aux crosses cuivrées se déroulant avec puissance.
Dryopteris filix-mas 'Barnesii'	☀●		100-120	60	T		Fougère vigoureuse, érigée. Les frondes étroites, aux pinnules frisées, donnent à la plante un aspect et moussu.
Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactylon'	☀●		80-100	60	T		Frondes finement divisées en pinnules linéaires et fourchues.
Dryopteris goldiana	◐●		120-150	60	T		Fougère géante. Les frondes au long pétiole et au port très érigé, d'un vert jaunâtre, forment de touffes claires et aériennes. A ne pas exposer aux vents.
Dryopteris tokoyensis	◐●		100-120	40	T		Fougère élancée à l'allure de sentinelle. Les frondes étroites de couleur vert clair, aux pinnules larges, sont portées par une souche vigoureuse. Pétiole cassant à abriter du vent.
Dryopteris wallichiana	◐●	SP	100-120	60	F		Fougère impressionnante par son élégance et son envergure. Le rachis jusqu'à la nervure est protégé d'écailles noires d'un effet marquant lors du déroulement des crosses. Se pique d'or et cuivre en hiver.
Matteuccia pensylvanica	◐●		120-150	50	T à M		Très grande fougère à couronne évasée et élancée, ne développe que de rares rejets. Les frondes fertiles, plus courtes, apparaissent en son centre.
Matteuccia struthiopteris Indigène	◐		100-120	↔	T à M		Frondes stériles formant une couronne régulière élancée, frondes fertiles plus courtes en son centre. Rhizome courts, produisant de longs stolons. Extension rapide, frondaison dynamique



La Fougeraie. Pépinière de fougères et plantes d'ombre.

Fourneau de Vaulx, 2 - B-5646 Stave - Belgique
 Tél.: 071/72 92 99, 02/653 30 24 - Fax: 071/72 92 99, 02/653 30 24
 E-mail: info@fougères.be - www.fougères.be - www.varens.be

☀ = plein soleil ; ● = ombre ; ◐ = mi-ombre. P = persistant ; SP = semi-persistant. F = frais ; H = humifère ; M = marécageux ; S = sec ; T = tout type de sol. ▲ = craint l'acidité ; ☹ = craint le calcaire. I = Indigène.							
	Expo	Feuil	H (cm)	L (cm)	Sol	pH	Descriptif
<i>Osmunda claytoniana</i>	◐		80	100	F à M		Touffes de frondes stériles à segments lobés réunis en plusieurs bouquets sur une souche rhizomateuse. Les frondes fertiles, plus longues, sont interrompues en leur milieu par une production de spores d'abord noirâtres en suite jaune rouille.
<i>Osmunda regalis</i> Indigène	☀ ◐		100-200	150	F à M	☹	La plus grande et la plus imposante, appelée aussi fougère fleurie. Frondes atteignant 2 mètres de long à découpes lobées. Certaines sont entièrement stériles, d'autres plus estivales, fertiles, se terminent au sommet par une panicule de sporanges brun-roux. Couleurs d'automne flamboyantes.
<i>Osmunda regalis</i> 'Purpurescens' indigène	☀ ◐		100-200	150	h	☹	Comme l'espèce, pétiole rouge.
<i>Polystichum setiferum</i> Indigène	◐ ●	P	80	60	T		Frondes lancéolées, vert foncé, portant des dents soyeuses. Silhouette érigée, parfois plus ouverte, les crosses se déploient en exposant de nombreuses écailles argentées. Facile et vigoureuse.
<i>Polystichum setiferum</i> 'Bevis'	◐ ●	P	80	100	T		Comme l'espèce mais les frondes, lisses, montrent des pinnules plus allongées et espacées, les segments s'incurvent gracieusement vers l'extrémité. Touffe de taille imposante. Variété stériles, les frondes sont utilisées en bouquetterie.
<i>Polystichum setiferum</i> 'Plumosum'	◐ ●	P	80	60	T		Comme l'espèce, mais silhouette érigée parfois plus ouverte, les frondes sont finement découpées et plumeuses, légères.
<i>Pteridium aquilinum</i> Indigène	☀ ◐		100-150	200	T		Frondes solitaires sur un long rhizome traçant. Grande fronde 3 ou 4 fois divisée, pennes étagées, disposées horizontalement, sur de très hauts pétioles nus. Les frondes virent au jaunes or en automne et une fois desséchées elles persistent longtemps accrochées l'une à l'autre.
<i>Thelypteris palustris</i> Indigène	☀ ◐		30-80	100	M		Plante à rhizome traçant, émettant des frondes solitaires et espacées, très sociable (traverse les autres végétaux sans faire concurrence). Longue fronde étroite, effilée vert tendre. Pénètre la partie inondée jusqu'à 30 cm. Sur sol plutôt calcaire.
<i>Woodwardia fimbriata</i>	◐		100-120	50	F à M		Fougère à grand développement sur un rhizome court et vigoureux. Longue fronde coriace sur un pétiole court. Segment à dents fines et étroites. Se plait en bord d'étang ou de ruisseaux. Abrisier les premières années. Rusticité : -10 C°.